

DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

RHONE-ALPES

22, rue de Brest - LYON Téléph.: FR. 82-51

Bimensuel

Comptes chèques postaux Lyon 2168-43 — Fédération des Groupements de Défense, 4, place Gensoul — LYON

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région.

AVERTISSEMENTS

VIGNE

MILDIOU. — A) Région d'appellation « Beaujolais » : Se reporter aux avis spéciaux 190 B et 191 B affichés sur les panneaux municipaux et expédiés spécialement aux abonnés de ce secteur;

- B) Autres régions : Sur toutes les vignes non traitées depuis le 17 juin, effectuer un nouveau traitement :
 - d'urgence dans les régions des listes A et B ci-dessous;
 - entre le 27 et le 30 juin dans les régions de la liste C ci-dessous.

Toutefois, dans les régions de cette dernière liste où aucune pluie ne se serait produite entre le 20 et le 27 juin, il y aura lieu d'attendre un avis ultérieur pour traiter;

— à une date qui sera fixée ultérieurement dans les régions comprises dans aucune de ces trois listes.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES (Pommier et poirier). — Un nouveau traitement devra être exécuté aux dates suivantes :

- 1º Plantations qui n'ont pas reçu de traitement depuis le 7 juin : d'urgence;
- 2º Plantations traitées entre le 7 et le 11 juin : traiter entre le 26 et le 29 juin;
- 3° Plantations traitées entre le 12 et le 47 juin :
 - A) Régions de la liste A ci-dessous : d'urgence;
 - B) Régions de la liste B : entre le 26 et le 29 juin;
 - C) Autres régions : attendre un avis ultérieur;
- 4º Plantations traitées depuis le 17 juin : attendre un avis ultérieur.

CARPOCAPSE (Pommier, poirier, prunier, abricotier et noyer). — Le précédent traitement devra être renouvelé d'urgence sur les seules plantations de la liste A ci-dessous qui ont été traitées avant le 17 juin mais pas depuis.

Un avis ultérieur précisera les dates de traitement sur les autres plantations.

TORDEUSE ORIENTALE (En pépinière seulement). — Un nouveau traitement devra être appliqué avant le 35 juin.

P184

LISTE DES REGIONS SUIVANT L'IMPORTANCE DES PRECIPITATIONS DU 17 JUIN

LISTE A (Plus de 20 millimètres) :

Ain: 47, 48, 49 et 52;

Drôme : 127;

Isère: 109, 110, 114 et 117; Savoie: 83, 85, 86, 87, 88 et 89;

Haute-Savoie: 67 et 70.

LISTE B (10 à 20 millimètres) :

Ain: 40, 44, 45, 46, 50 et 51;

Drôme : 124;

Isère: 102, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 118 et 120;

Loire : 2:

Rhône: 31 et 32;

Savoie: 81, 82 et 93;

Haute-Savoie: 62, 65, 66, 68, 69, 71 et 72.

LISTE C (5 à 10 millimètres) :

Ain: 41, 42 et 43;

Ardèche: 141 et 142, au nord de Saint-Péray;

Drôme: 121, 122, 123, 126 et 135; **Isère**: 101, 103, 104, 105 et 119;

Loire : 5 et 6:

Rhône: 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34 et ancienne région 38;

Savoie: 91:

Haute-Savoie: 60, 61, 63 et 64.

COURRIER DES ABONNES

D'un abonné de la Savoie en date du 20 juin 1956 :

« Je tiens à vous signaler que, dans notre région, nous avons une grosse attaque d'araignées « rouges sur pommiers Canada plein vent. Les arbres sont devenus gris, aussi je viens de faire, à la « date du 17 juin, un traitement au Déméton; pourriez-vous me dire si un seul traitement suffira ou « si je devrai encore en faire un deuxième et à quelle époque ? »

Réponse: A pareille époque, on trouve à la fois des araignées écloses accessibles au traitement et des œufs qui ne sont pas détruits. Aussi est-il nécessaire de renouveler le traitement à la fin de l'éclosion de ces œufs, soit environ dans 18 à 20 jours.

Nous rappelons, toutefois, que l'emploi du Démeton et du Démeton méthylé doit cesser deux mois avant la récolte. Ces produits peuvent alors être remplacés pendant un mois et demi par des produits à base de Parathion, moins efficace que le Déméton.

Le Contrôleur chargé des Avertissements agricoles : P. LATARD.

L'Inspecteur de la Protection des végétaux :
A. PITHIOUD.